

RAPS - Insekten im Auge behalten!

Praxiswissen

Jetzt fliegen sie wieder - die Stängelrüssler. Ab Temperaturen über 12 °C ist mit intensivem Einflug in die Bestände zu rechnen.

Wie viel Zeit bleibt Ihnen zum Handeln?

Damit meinen wir, wie schnell nach dem Zuflug / Überschreiten der Schadschwelle (*mit Gitter: 5 Käfer in 3 Tagen*) ein Insektizideinsatz angebracht ist. Je nach Rüsslerart und Temperatur beträgt dieser Zeitraum zwischen 3 Tagen und 2-3 Wochen.



Großer Rapsstängelrüssler



Gefleckter Kohltriebrüßler
rotbraun gefärbte Fußglieder
"rote Schuhe"

Konkret bedeutet das zur Schadensabwendung:

Den großen Rapsstängelrüssler können Sie durch eine spätestens nach 3 Tagen (*nach Überschreiten der Schadschwelle*) platzierte Insektizidbehandlung in Schach halten. Der Reifungsfraß vor der Eiablage des gefleckten Kohltriebrüßlers erweitert diese Zeitspanne (*Schadschwelle / Insektizideinsatz*) auf 1 Woche (*Temperatur über 20 °C*) beziehungsweise auf bis zu 2-3 Wochen (*Temperatur unter 20 °C*).

Leider ist auch hier von einer beginnenden Resistenz bei den Pyrethroiden (*Decis forte, Karate Zeon, Mavrik*

Vita, Nexide, ...) auszugehen. Die Beratung empfiehlt deswegen zur Verbesserung der Benetzung und Erhöhung der Wirkung / Wirkungsdauer eine Tankmischung mit Netzmitteln.





Hat Ihr Spritzwasser eine Härte von mehr als 14° dH, empfehlen wir den Einsatz von **PHFIX®forte**. Ist die Wasserhärte unkritisch, sorgt der Zusatz von **LIMOWET_{CITRUSÖL}** für einen zusätzlichen Insektizid-Wirkungsschub, der Schädlinge abwehrt.

Ihr Nutzen in Kürze - der Unterschied!

- ▶ **PHFIX®forte** und **LIMOWET_{CITRUSÖL}** erhöhen die Haftung und die Benetzung der Pflanzenblätter und der Schädlinge (optimiert den Bekämpfungserfolg).
- ▶ **PHFIX®forte** - Der saure Puffereffekt schützt Insektizide vor schnellem Abbau, verlängert die Wirksamkeit und verhindert Minderwirkungen bei hartem Wasser.
- ▶ **LIMOWET_{CITRUSÖL}** – Mit Mega-Benetzung und perfekter Haftung verstärkt Wirkung und hält Schädlinge auf Abstand.

Praktische Anwendung

1. Spritztank zu 1/3 mit Wasser füllen
2.  **PHFIX®forte**
(Farbumschlag) Wirkstoffschutz + Durchdringung
3. **Insektizid** einfüllen
4.  **LIMOWET_{CITRUSÖL}**
Mega-Benetzung-Haftung, schreckt Schädlinge ab.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.



Ihr Ansprechpartner

Martin Sudau

Geschäftsleitung

Telefon: +49 (0) 8122 8809880

info@sudau-agro.de



SUDAU AGRO GmbH

Wilhelm-von-Diez-Straße 18

D-85435 Erding

info@sudau-agro.de

Mehr unter:

Telefon: 08122 - 880 9 880

oder www.sudau-agro.de

SUDAU AGRO